

مرض فيروس ماربورغ

معدل الوفاة
٪٦٠ - ٪٨٠

مرض فيروس ماربورغ (MVD) أو المعروف سابقاً
بأسم حمى ماربورغ النزفية وهو مشابه لفيروس الإيبولا



المصدر

- خفافيش الفاكهة.
- القردة الأفريقية
- الخضراء.
- الخنازير.

طرق الانتقال

١. الاتصال المباشر مع المريض.
٢. سوائل جسم المصاب
«البراز والقيء والبول واللعاب
والإفرازات التنفسية».
٣. نقل الدم.
٤. الأبر الملوثة.
٥. العلاقة الجنسية.
٦. الاتصال بالحيوانات في الدول
الموبوءة «الخفافيش، الشمبانزي».

الفئات الأكثر عرضة

- المسافرون الذين يزورون
الكهوف والمناجم التي تسكنها
الخفافيش المصابة.
- من لهم صلة مباشرة بالمريض
من العائلة والطاقم الطبي.

فترة الحضانة

- الفيروس لا ينتقل
بين البشر قبل
ظهور الأعراض.
- فترة الحضانة:
٢ - ٢١ يوم.



الأعراض

من اليوم الأول:

- حمى شديدة.
- صداع حاد.
- وعكة شديدة.
- ألم العضلات.

من اليوم الثالث:

- مغص في البطن.
- إسهال مائي حاد.
- غثيان وتقيؤ.

من اليوم الخامس - السابع:

- نزيف من مواضع عدة.

التشخيص

- لا يوجد اختبار لتشخيص
المرض في فترة الحضانة.
- عند ظهور الأعراض يتم
التشخيص **عن طريق:**
- اختبار الأجسام المضادة IgG, IgM
- فحص RT-PCR
- عزل الفيروس والمجهر الإلكتروني.

العلاج واللقاح

- لا يوجد لقاح أو علاج.
- يتم عزل المريض.
- الرعاية الداعمة وعلاج
الأعراض قد تساعد في
تحسن المريض.

الوقاية

أ. تأجيل السفر إلى الدول الموبوءة.

ب. يجب على المسافرين إلى الدول الموبوءة لأسباب طارئة، اتخاذ التدابير الوقائية التالية:

- غسل اليدين بانتظام
- تجنب الاتصال بالمرضى الذين تظهر عليهم الأعراض.
- تجنب ملامسة الدم وسوائل الجسم الأخرى للمصابين.
- تجنب ملامسة خفافيش الفاكهة وكذلك تجنب زيارة الكهوف والمناجم التي تعيش فيها.
- تجنب الاتصال مع الحيوانات مثل «الشمبانزي والغوريلا».
- الحد من خطر الانتقال الجنسي.
- عزل أنفسهم مباشرة والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية إذا أحسوا بأي من الأعراض أثناء السفر أو بعده حتى ٢١ يوماً.
- على القادمين إبلاغ الطبيب بزيارتهم لمنطقة موبوءة بالمرض.