



سَلْطَنَة عُومَان
وَزَارَة الصَّحَة

ختان الذكور



الوقت المثالي
لإجراء الختان
يكون خلال ٢٤
إلى ٧٢ ساعة
بعد الولادة



لزيارة المكتبة الإلكترونية
وزارة الصحة



 OmanHealth   OmaniMOH
 www.moh.gov.om  24441999

ما هو الختان؟


الختان هو إجراء جراحي لإزالة الجلد الرقيق الذي يغطي مقدمة العضو التناسلي (ويسمى القلفة) عند الأطفال الذكور ، ويجرى غالباً للأطفال حديثي الولادة.



ماهي فوائد الختان؟

- سهولة النظافة الشخصية.
- انخفاض خطر التهابات الجهاز البولي.
- انخفاض خطر العدوى بالأمراض المنقولة جنسياً.
- انخفاض خطر الإصابة بسرطان العضو التناسلي.

ماهي خطوات إجراء عملية ختان الذكور؟



- يستلقي الطفل على ظهره.
- يتم تعقيم العضو التناسلي وتطبيق مخدر موضعي.
- يتم وضع حلقة بلاستيكية حول مقدمة العضو التناسلي وربط جزء القلفة المراد قصه بخيط خاص.
- يتم قص جلد القلفة وإزالته.
- يتم التأكد من عدم وجود نزف دموي في نهاية الإجراء.
- يتم إضافة مرهم مخدر.

س يبقى الخيط في مكان الربط مع الحلقة البلاستيكية لحين التئام جرح العملية حيث تسقط من تلقاء نفسها خلال فترة أسبوع إلى أسبوعين.

لماذا يفضل إجراء الختان في مرحلة مبكرة من العمر؟

إن الوقت المثالي لإجراء الختان يكون خلال ٢٤ إلى ٧٢ ساعة بعد الولادة، إلا إذا وجدت حالة صحية لا تسمح بذلك ، ويفضل إجراؤه في هذا العمر للأسباب التالية:

الختان المتأخر

عملية أكثر تعقيدا تستدعي جدولة واستخدام التخدير العام

تستغرق العملية وقتا أطول

يتم استخدام غرز جراحية

فترة الشفاء أطول وقد ترتبط بصدمة نفسية

احتمالية حدوث المضاعفات أكبر مثل النزيف والعدوى والآثار المرتبطة بالتخدير بالإضافة إلى تأثيره على أنشطة الطفل اليومية

الختان المبكر (٢٤ - ٧٢ ساعة بعد الولادة)

استخدام أبسط التقنيات وبتخدير موضعي

تستغرق العملية ما يقارب ٥ إلى ١٠ دقائق

لا توجد حاجة لاستخدام غرز جراحية

فترة الشفاء أسرع والنتائج أفضل

ندرة حدوث مضاعفات جانبية

ماذا يجب على الوالدين القيام به بعد عملية الختان؟



- الحفاظ على المنطقة نظيفة وجافة قدر الإمكان وتطهيرها بالماء الدافئ والصابون بلطف.
- تجنب الضغط على مكان الختان عند حمل الطفل.
- الحرص على تغيير حفاض الطفل بشكل متكرر وتشبثه بشكل فضفاض.
- يمكن إضافة الفازلين على منطقة الختان لتجنب التصاقها بالحفاض.
- عدم استعمال المناديل المعطرة لتنظيف منطقة الختان.
- تجنب نزع الحلقة من مكانها والحفاظ عليها لحين سقوطها من تلقاء نفسها.

متى تستدعي مراجعة الطبيب؟



- في حال عدم تبول الطفل لأكثر من ١٢ ساعة بعد إجراء الختان.
- في حال وجود نزيف دموي مستمر.
- في حال ملاحظة وجود افرازات كريهة الرائحة من مكان الختان.
- في حال عدم سقوط الحلقة البلاستيكية بعد أسبوعين من إجراء الختان.